


# Orego-Stim Liquid



## Composición

Orego-Stim Liquid está compuesto por un 5% de aceite esencial de orégano de *Origanum vulgare subsp. Hirtum*, y 95% emulsionante y agua. El emulsionante es aceite de ricino (13,36%) y el diluyente es agua desmineralizada (81,64%).

La composición química del aceite de orégano está dominada por monoterpenoides y sesquiterpenos, según se ha reportado en muchos estudios publicados, revisados por pares, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anestésicas.

El emulsionante se incluye para permitir que el aceite esencial de orégano se disperse uniformemente dentro del líquido al que se agrega la Orego-Stim Liquid. Adicionalmente, se agrega agua como diluyente.

## Especies de destino

Diseñado para su uso en aves de corral, cerdos, ovejas, cabras, vacas, camarones y peces.

## Beneficios principales

- ✓ Ayuda a mantener un apetito saludable a través de las etapas críticas del crecimiento.
- ✓ Apoya al animal durante períodos de estrés.
- ✓ Ayuda a mejorar la eficiencia de la alimentación.
- ✓ Optimiza el mecanismo de defensa natural de los animales.
- ✓ Promueve la salud intestinal a través de todas las etapas críticas del crecimiento.

## Instrucciones de uso

Las dosis de inclusión de Orego-Stim Liquid varían según las condiciones y la especie de destino.

Consulte el reverso para obtener detalles.

Orego-Stim Liquid se administra al agua potable del ganado en cantidades variables dependiendo de la especie objetivo.

## Especificaciones típicas

<b>Análisis físico</b>	Líquido lechoso de color blanco y olor característico
<b>Empaque</b>	Envasado en botellas de 1L
<b>Tiempo de conservación</b>	24 meses desde la fecha de fabricación
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la humedad
<b>Precauciones</b>	Irritante
<b>Acreditación</b>	Todos los productos de Anpario cuentan con la aprobación de FEMAS





## Instrucciones de uso

Orego-Stim Liquid se administra al agua potable del ganado en cantidades variables dependiendo de la especie objetivo.

### Avicultura

Primera semana y durante períodos críticos: 300 ml por 1000 L de agua.  
Etapas restantes: 150 ml por 1000 L de agua.

### Cerdos

PreStarter hasta 15 días post-destete: 500 ml por 1000 L de agua.  
15 días post-destete hasta 25 kg de peso: 250 ml por 1000 L de agua.  
Desde los 25 kg hasta el sacrificio: 125 ml por 1000 L de agua.  
Cerdas gestantes y lactantes: 150 ml por 1000 L de agua.

### Ovejas y cabras

Dosis inicial de 500 ml por 1000 L de agua durante 28 días seguido de una dosis de mantenimiento de 125 ml por 1000 L de agua.

### Ganado vacuno y lechero

Ganado vacuno de carne: Iniciar con una dosis de 500 ml por 1000 L de agua durante 28 días, seguido de una dosis de mantenimiento de 125 ml por cada 1000 L de agua.  
Vacas de leche: 15 ml por cabeza al día durante 28 días.  
Terneros: Hasta 2 ml de Orego-Stim Liquid por cabeza por día.

### Camarones, Truchas y Tilapias

El nivel de inclusion recomendado es de 500 ml a 1 litro por tonelada de alimento balanceado. En casos de eventos y enfermedades, se puede aumentar gradualmente la dosis hasta 2,2 litros por tonelada de alimento balanceado.